



## **Instrucciones Post-Operatorias**

*Para Tratamientos de Conductos No-Quirúrgicos*

**Usted está recibiendo estas instrucciones dado que se le acaba de realizar un tratamiento de conductos. Su tratamiento puede haber sido completado, o su diente afectado ha sido medicado y requiere de una segunda cita para completar el tratamiento. Por favor siga las instrucciones que se indican a continuación:**

- Absténgase de ingerir comidas o bebidas hasta que el efecto de la anestesia haya desaparecido.
- Evite masticar o morder con el diente tratado hasta que visite a su odontólogo y este haya restaurado completamente el diente tratado.
- Utilice el Hilo Dental y Cepille sus dientes como normalmente lo hace.

### **Que debe esperar luego de un tratamiento:**

La sensibilidad en el área que rodea el diente tratado es normal durante algunos días luego del tratamiento. Estos síntomas son típicamente temporales y deben ser fácilmente controlados con medicamentos disponibles sin prescripción médica. De ser necesario, favor utilice el siguiente régimen de medicamentos durante las 48 horas siguientes al tratamiento:

-Tome 3 tabletas (600 mg) de Ibuprofeno cada 6 horas. **(No exceder los 3200 mg en un día)**

**O**

-Tome 2 tabletas (650 mg) de Acetaminofen cada 6 horas. **(No exceder 3000 mg en un día)**

**NO CONSUMA ALCOHOL CON ESTOS MEDICAMENTOS**

De ser medicado con algún tipo de prescripción narcótica, esté al tanto de que las mismas le pueden generar somnolencia o desorientación por lo cual le pedimos evitar conducir u operar maquinaria. **Advertencia: Si usted se encuentra embarazada, consulte con su médico antes de tomar cualquier tipo de medicamentos. Si a usted se le prescriben antibióticos, le notificamos que los mismos pueden disminuir la efectividad sobre los anticonceptivos.**

**Contacte inmediatamente a su Endodoncista al (201) 354-6201 si usted desarrolla alguno de los siguientes síntomas:**

- Dolor agudo que no se puede controlar con el régimen de medicamentos recomendado
- Manifestación de alguna reacción alérgica a los medicamentos indicados, como erupción, picazón o urticaria.
- Náuseas causadas por los medicamentos indicados.
- Hinchazón dentro o fuera de la boca.
- Aparición de los síntomas originales previos al tratamiento
- Pérdida de la restauración provisional.

Para **emergencias** en horario extendido, favor visitar su sala de emergencias local.

**La restauración permanente del diente tratado con un tratamiento de conductos es crítica para el éxito del mismo. Favor contactar a su dentista a la brevedad posible para agendar su próxima cita.**